

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
72	8/1(日)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性	副鼻腔炎	ハウスダスト, アトピー, 金属アレルギー		12:33 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0583) 13:00 BP 135/82 P 86 SpO2 98% R 30 S:のどがむずがゆい 咳が出る O:普段から上記の症状軽度あるが、会場に来るまで症状なかった。 13:05 S:少しおさまってきている。 13:45 S:臥床後、左のどのかゆみが出たが今はおさまった。 BP 123/81 P 62 SpO2 98%	
73	8/1(日)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性	アスピリン喘息, 慢性副鼻腔炎	ロキソニン: 蕁麻疹, 喘鳴 さば: 下痢 ナツツ: 咳, 鼻汁		10:30 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0583) 10:36 BP 145/82 P 101 SpO2 100% 頸部熱感(+) 力が入りにくい感じ 吐気(-) 血の気が引く感じ しっかり受け答え可 10:42 BP 136/79 P 83 Dr診察 S:だいふ落ち着いてきた 10:55 S:落ち着きました BP 126/86 P 82 SpO2 96% 11:00 BP 112/72 P 73 SpO2 98% Dr報告し、帰宅可	
74	8/1(日)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性				11:30 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0583) 保健師対応ケース	
75	8/1(日)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性				12:14 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0583) 12:32 BP 128/89 P 81 SpO2 97% 接種部位搔痒感(接種後10分) 吐気(-) 倦怠感(-) 動悸(-) 発赤(-)	
76	8/1(日)	宇土シティ	1回目	30歳代	男性				14:47 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0583) 14:57 BP 113/83 SpO2 100% 接種部位腫れ(+) 痛み(-) 発赤(-) しびれ(-) 気分不良(-)	
77	8/4(日)	宇土シティ	2回目	40歳代	女性		なし	1回目の接種後胸部不快あり、嘔気あり。バイタルは安定、経過観察後、症状改善し帰宅。	14時38分 ワクチン接種(ファイザー製 コミナティ筋注EY0583) 14時39分 吐き気が少しあります。ふわふわする感じがある。 BP 132/80 P 72 SpO2 99% Dr指示 経過観察 30分の指示 14時45分 BP 120/71 P 60 SpO2 99% 14時50分 吐き気消失 ふわふわ感残存 14時55分 BP 119/81 P 66 SpO2 99% S)顔と指先に血の気が引くような感じがします。吐き気なし。動悸なし 冷汗なし 15時05分 BP114/73 P 66 SpO2 99% S) 血の気が引く感じは収まった。 15時13分 Dr報告 15分追加観察 15時25分 BP 108/66 P 66 SpO2 99% めまいなし 吐き気なし 15時32分 BP116/62 P 60 SpO2 99% Dr観察 座位での気分不良なく。帰宅可とする。	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
78	8/4(日)	宇土シティ	2回目	40歳代	女性		花粉症	インフルエンザ予防接種で 接種部位発赤	14時07分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注 EY0583） 14時13分 k t Dr指示 臥床で経過観察 処置室に独歩で移動 BP 126/81 P 82 SpO2 98% KT 37.6℃（接種前は36.6℃） 14時21分 頭痛が増強 14時36分 BP 129/79 P 89 SpO2 99%KT37.5℃ 少々変わらず。Dr指示 救急搬送しましょうと判断。 14時40分 救急車要請。（梅田Ns） 14時47分 救急病院 救急受信依頼 14時50分 救急車到着 14時53分 救急病院 受け入れ不可能と返事 14時57分 2件目 救急病院電話。受け入れ可能の返事 15時03分 市役所報告 家族連絡同時進行 15時07分 ご主人到着 15時11分 救急車出発（ご家族のみ同乗） 17時59分 市役所から病院に状況確認 迷走神経反射かなとコメント。救急病院到着時はほぼ軽快。KT37.8℃ 帰るころには平熱となっていた。コロナ抗原検査は陰性。血液検査も特記事項なし。 紹介時のコメント コロナワクチン 2回目接種後しばらくして、発熱（37.5-37.6℃）接種前36.6℃でした。 一般状態は不良ではないのですが、接種後ですので心配です。御高診御加療お願いいたします。	あり
79	8/8（日）	宇土シティ	2回目	50歳代	女性	高血圧症，脊椎側弯症			15時13分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 15時30分 両手掌の点状発赤，痒みなし。 BP 157/103 P 83 SpO2 98/99% Dr診察 経過観察30分。 15時40分 両手掌発赤継続 左<右 痒みなし。 BP 158/106 P 80 SpO2 99% Dr診察，気分不良等なし，帰宅可能。	
80	8/10(火)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性				15時16分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 15時28分 O：左手背が腫れている気がする。 S：両手背発赤あり BP 162/115 P 77 SpO2 97% 15時33分 独歩にて観察室へ移動。 15時40分 BP150/105 P 68 SpO2 97% T36.8℃ 15時47分 症状軽減あり。 16時00分 BP 145/99 P 68 SpO2 97% Dr診察，症状軽快に手帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
81	8/10 (火)	宇土シティ	1回目	10歳代	女性	エビリファイ内服中			16時10分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 16時20分 嘔気あり，嘔吐なし。顔色不良あり。 BP76/37 P 75 SpO2 99% Dr報告，診察。ベット臥床にて観察。 16時26分 独歩にて観察室へ移動。 16時30分 BP107/61 P 59 SpO2 99% 顔色やや改善 水分2口摂取。嘔気なし。 16時40分 BP 105/66 P 62 SpO2 99% O) 大丈夫です。 Dr報告，診察。アレルギー兆候なし。気分不良なし。帰宅可能。 付き添いの家族と帰宅。	
82	8/11 (水)	宇土シティ	1回目	10歳代	女性				15時28分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 15時37分 S：吐気がする。 BP 73/41 P 69 SpO2 99% 15時40分 観察室へ移動。 15時45分 BP113/76 P 59 T36.7℃ S：採血の時も具合悪くなる。 15時50分 S：良くなりました。 Dr報告，診察。症状軽快にて帰宅可能。 16時00分 帰宅。	
83	8/11 (水)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性		アレルギー性鼻炎，アルコール綿で発赤		接種前 P 78 SpO2 99% 16時09分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 16時24分 S：ホワツとする。視界がぼやける。 BP 144/89 P 92 SpO2 99% Dr報告，診察。15分観察延長。 16時35分 BP 125/79 P 89 SpO2 99% 症状変わりなし。 16時39分 Dr診察。症状OK 帰宅可能。	
84	8/11 (水)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性				16時11分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） BP 130/86 P70 SpO2 99% 左上腕の違和感（接種 左上腕） 16時30分 Dr 診察。経過観察15分追加。	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
85	8/11（水）	宇土シティ	1回目	40歳代	女性		小麦粉：痒み、湿疹。		17時31分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 17時43分 浮遊感あり。 17時51分 BP 146/103 P 73 SpO2 98% 嘔気なし。 17時54分 Dr診察。観察15分延長。 17時57分 BP 132/92 P 72 SpO2 99% 浮遊感軽減。 18時13分 BP 138/87 P 68 SpO2 99% 18時22分 BP 131/82 P 67 SpO2 98% 症状軽快、 普段よりほてっている感じがある。 18時24分 Dr 診察。症状軽快にて帰宅可能。	
86	8/11（水）	宇土シティ	1回目	50歳代	女性		妊娠中、点滴にて発疹があった。		18時28分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 18時24分 のどのつかえ感 BP 143/103 P 82 SpO2 95% 18時45分 Dr診察。 18時58分 BP 122/95 P71 SpO2 95-96% 30分経過。咽頭つかえ感持続中。唾液を飲んでも違和感が残る。 嘔気なし、呼吸症状異常なし、呼吸苦なし 19時03分 セレスタミン1錠服用。10-15分経過観察の指示。 19時13分 BP 137/98 P65 SpO2 97-98% 咽頭つかえ感が若干軽くなった。 Dr 診察、報告。帰宅可能。	
87	8/11（水）	宇土シティ	1回目	40歳代	女性				8：14 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583）L 18：31 BP 167/83 P 59 SpO2 98% S:左腕が痛い。打って5分経ったぐらいから。 Dr 診察。帰宅可となる。	
88	8/11（水）	宇土シティ	1回目	30歳代	男性		花粉症 軽度		18：20 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583）L 18：30 BP 81/47 P 53 SpO2 99% S:フラフラする 18：35 観察室へ車いすで移動。→症状改善中 S:少し良くなりました。 18：37 BP 117/71 P 71 SpO2 98% 18：39 ルート確保 24G左前腕 生理食塩水 18：41 BP 113/69 SpO2 100% 18：54 呼吸苦訴えあり 18：55 BP 111/76 P 71 SpO2 98% R 18 19：20 BP 119/80 P 65 SpO2 98% R 13 T36.5℃ 19：25 DIV 2本目切り替え 宇土シティ閉館時間に近くなるため、診察医の医療機関へ移動	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
89	8/12(木)	宇土シティ	1回目	40歳代	男性	免疫不全			14時23分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 14時38分 経過観察終了後に退出時に転倒。 BP92/55 P 52 SpO2 98% 左腕の察過傷 気分不良なし。 Drコメント 基礎疾患による視野狭搾→転倒 ※ワクチンによる症状乏しい 14時44分 独歩で観察室誘導。 BP79/44 P 53 15時00分 BP 160/86 P 63 SpO2 99% 15時15分 BP 159/89 P 68 SpO2 100% 自覚症状なし 15時19分 Dr, 診察 帰宅可	
90	8/12(木)	宇土シティ	1回目	30歳代	男性	片頭痛			14時49分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 15時00分 床に座り込んでいるところを発見 脱力感があり吐き気あり BP109/89 P 83 PsO2 99% 以前注射で気分が悪くなったことがあって、接種後5分くらいから気分が悪くなった。 15時05分 Dr診察 血管迷走神経反射疑い 観察室に独歩で移動。30分観察延長 15時13分 BP 102/70 P 60 SpO2 99% 15時23分 BP 105/69 P 72 SpO2 98% Dr診察 活気が戻ってきており帰宅OK	
91	8/12(木)	宇土シティ	1回目	40歳代	男性		アレルギー性鼻炎 昨年までは受診していた		17時31分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 18時02分 背中がかゆい。他症状なし。（経過観察後の訴え） 18時17分 Dr診察 帰宅可	
92	8/12(木)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性				17時53分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583） 18時01分 貧血っぽい感じの訴えあり BP 82/52 P 60 SpO2 99% 18時04分 BP 88/59 P 53 SpO2 98% Dr診察 車椅子で観察室に移動後、下肢拳上の指示 献血で気分が悪くなったことがあります。とのこと 18時08分 BP 104/61 P 55 Dr報告 経過観察30分の指示 18時15分 BP112/66 P 56 呼吸数 12/分 18時35分 Bp100/64 P 53 SpO2 99% 呼吸数10/分 Dr報告 帰宅可	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
93	8/15(日)	宇土シティ	2回目	10歳代	女性				13時01分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EY0583）2回目接種 13時16分 待機時間終了 著変無く会場退出 13時40分 買い物中に、シティ1階で倒れているところを発見され、お店の人がおぶって会場まで連れてくる。ストレッチャーで予診室観察室収容 13時49分 BP 111/68 P 55 SpO2 97% 意識レベル 20（発語なし、返答に対してうなずきあり）四肢わずかに動く。 13時50分 生食開始。 13時53分 BP114/71 P 55（不整なし） SpO2 99% 呼吸数16回 KT36.6℃ 14時00分 地域医療センター救急外来 電話 受け入れOK 生理5日目 立ち眩みがよくありますと家族より 朝食9:30 パンと水分のみ 14時08分 救急要請 ストレッチャーで奥の観察室へ移動。 14時17分 救急隊到着 BP104/64 P54 意識レベル変わらない。指示動作なし 痛覚なし 四肢冷感あり。血色不良 14時24分 救急隊発車 お母さんとお姉さん同乗 翌日報告あり 頭部CT問題なし。血液検査問題なく、当日帰宅となった。	
94	8/17（火）	西部老人福祉センター	1回目	40歳代	女性		子供のころにアトピー 鼻水が出やすい 受信歴なし	当日の体調：生理痛あり 13時にイブ飲んで少し貧血っぽいかなという感じ	17時47分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 18時00分 左第4.5 指から手首にかけてのしびれがあり（左腕にワクチン接種） Dr報告 経過観察 18時07分 BP 137/99 P 69 SpO2 99% 帰宅可	
95	8/17（火）	西部老人福祉センター	1回目	40歳代	男性	不眠症			18時20分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 18時35分 頭がカーとした。冷汗あり 左の第3.4 指の感覚がない。 BP 102/49 P 48 SpO2 100% 両脇を抱えられての観察室移動 Dr診察 15分観察延長 18時38分 Dr指示 水分補給の指示 2口摂取 吐き気なし。 18時40分 BP106/71 P 54 SpO2 98% 18時48分 症状消失 BP 95/66 P 64 SpO2 99% 18時52分 Dr診察 呼吸苦なし 消火器異常なし 皮膚症状なし。アレルギー症状なし。 自宅で安静を支持して帰宅可 BP 106/73 P 58	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
96	8/20(金)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性	慢性甲状腺炎	20年前点滴の抗生剤で皮膚症状経度あり		14時46分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 14時53分 動悸あり BP 132/93 P 122 SpO2 98-100% 15時02分 P 76 動悸落ち着く 15時15分 BP 138/96 P 77 SpO2 100% 15時30分 BP162/102 P 54 SpO2 99-100% Dr診察 oval cavity in lp 15時37分 独歩にて観察室へ移動 15時49分 BP136/92 P 102 SpO2 100% 動悸消失 15時52分 BP142/105 P 107 SpO2 98% Dr報告 HR100 以下まで安静 16時15分 BP143/95 P 95 SpO2 100% 16時28分 独歩にて帰宅。	
97	8/20(金)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性		15年前インフルエンザにて接種部の腫脹ひどかった、以来接種していない		14時36分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注EF3622） 14時50分 嘔気あり、嘔吐なし。全身に脱力感あり BP 226/104 P 116 SpO2 99% Dr報告、診察。 14時55分 車いすにて救護室へ移動。意識レベル：清明。全身脱力感。嘔気持続。 15時03分 BP 217/123 P 93-100 SpO2 98% T37.0 S：最近、血圧は高めだった 嘔気症状は消失、意識レベルクリア。呼吸苦経度あり、左上腕接種部異常なし 倦怠感、全身脱力感あり、四肢冷感あり、本人より接種後すぐに嘔気症状があったとのこと 15時10分 ご主人到着 Drより状態説明後、救急要請の指示。 15時12分 Drより宇城総合病院へ受け入れ要請。→対応不可 15時15分 看護師介助にて座位 BP 200/102 15時18分 Drより済生会熊本病院へ受け入れ要請。→対応可能 生理食塩水 500ml 点滴開始 15時20分 救急車要請 15時23分 救急車到着 15時40分 救急車出発。ご主人付き添い。 Drコメント 済生会熊本病院 ER 科御中 いつもお世話になりありがとうございます。 患者さんは本日新型コロナワクチン1回目接種された方で、これ以前にインフルエンザ予防接種で局所の腫脹があり、その後予防接種は一切避けていた由。本日接種の5分後から気分不良、悪心出現、 BP 206/104 P120 SpO2 99-100% T37.0 意識清 その後悪心おさまるも、のどの詰まり感あり、発疹なし。BP217/113と下がらず P93 SpO2 98% 両上肢の脱力感ありとのこと（Barre. 握力左右差なし）平時基礎疾患もなく血圧不明ですが予防接種直	あり
98	8/20(金)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性				14時40分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 14時45分 両手のしびれあり、握力OK（左右差なし）感覚あり、足しびれ、チアノーゼなし、発疹なし。BP 119/96 P 82 SpO2 99% 14時50分 Dr診察。 15時00分 バイタル測定し異常なければOK BP102/87 P 76 SpO2 98%	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
99	8/20(金)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性	高血圧症	エビ、カニ、たまご→蕁麻疹 花粉症		15時50分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 16時16分 両下腿点状発赤あり、頭がぼーっとする。動悸少し。 BP162/91 P 88 SpO2 100% Dr診察経過観察の指示 16時22分 BP149/87 P 80 SpO2 100% 症状変わらず、他はどうもない。 16時35分 BP 154/90 P 78 S：少し落ち着きました。 Dr診察 症状改善にて帰宅可。	
100	8/20(金)	宇土シティ	1回目	30歳代	男性				15時59分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622）左上腕 16時32分 左腕上、左目のしびれあり。BP 116/76 P 94 SpO2 97% 本人より 診療病院通院中 戸惑いがあると同じ症状があると言われる。 Dr診察 経過観察の指示 16時35分 左上腕、左目のしびれ消失したが、違和感がある。 16時40分 BP 115/71 P 82 SpO2 99% 左目のみ違和感経度があるが、左上腕しびれ等消失。Dr 診察、症状軽快にて帰宅可	
101	8/20(金)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性		2013 オムニバックで痒み、発疹。		18時23分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622）左腕 18時58分 動悸少しあり、接種部圧迫されたような気がする。指先どうもない 不安な気持ちがある。BP 172/86 P 96 SpO2 98% Dr診察、経過観察の指示 19時06分 BP 152/97 P 81 SpO2 98% 接種部の痛み変わらず。 気持ちが少し楽になった。Dr 診察、症状軽快にて帰宅可。	
102	8/22(日)	宇土シティ	2回目	50歳代	女性	睡眠時無呼吸症候群		1回目のコロナワクチン後、熱37.5	13時21分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622）左上腕 13時38分 接種後10分くらいから、頭がぼーっとする。頭痛なし、嘔気なし、呼吸苦なし。 BP 134/92 P 66 SpO2 99% Dr診察、経過観察 13時50分 BP 130/80 P 77 SpO2 99% Dr診察、症状軽快、帰宅可能	
103	8/22(日)	宇土シティ	2回目	60歳代	女性		花粉症、症状あるときのみ服用する。現在症状なし 今まで予防接種を受けたことがない。		17時27分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 17時30分 緊張している。眠気がある。BP 142/114 P 84 SpO2 99% T36.1 Dr診察 経過観察 17時35分 BP134/110 普通の血圧はわからないといわれる。 17時41分 BP159/96 P 81 SpO2 99% 眠気あり、他はどうもない。 17時46分 BP143/103 P 83 気分不良なし 体調著変なしアレルギー 認めず、帰宅可能、状態変化あれば119要請することと言われる。	
104	8/25(水)	宇土シティ	2回目	40歳代	女性	外傷性神経障害、咳喘息	10年ほど前、ユニフィル（テオフィリン）にて頭痛、嘔気あり	体調：原因不明の微熱が夜に、T37.0 前半が毎日ある。倦怠感毎日ある。	15時55分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622）左上腕 15時57分 四肢に発疹薄くあり、掻痒感なし、接種部の発火あり。接種後1分くらいに気付いた。 BP 124/85 P 110 SpO2 100% Dr診察経過観察の指示。 16時06分 P 100 SpO2 98% 症状変わらず。 16時23分 Dr診察、帰宅可能。	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
105	8/25(水)	宇土シティ	2回目	20歳代	男性				17時57分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 18時01分 S：めまいがする O：顔面蒼白あり。 18時02分 Dr 報告診察，Dr記録：脈しっかり触れる。発汗あり。 PT「注射苦手なんです。」救護室へ移動指示 車いすにて移動する。 18時07分 BP109/60 P 58 SpO2 98% 冷汗あり。 下肢挙上の指示，点滴必要なし。嘔気消失。 Dr記録：診察上，一過性の迷走N反射 susp 30分臥位でのフォロー指示。 その後，座位or立位でのBp再評価指示。 18時10分 BP 127/83 P 82 SpO2 99% S：人込みや注射など苦手なことになるといつもこうなります。 おなかが締め付けられる感じです。足は挙げていたほうが楽です。 18時25分 BP 129/88 P 76 SpO2 99% 18時28分 座位問題ないが，立位は足元のふわふわ感あり。S：もうちょっとかな BP 117/94 P 91 立位で測定 18時42分 立位，ふわふわ感なし，歩行時問題なし S：ふらつきないです，大丈夫です。 Dr報告，症状改善にて帰宅可能。	
106	8/25(水)	宇土シティ	1回目	20歳代	女性	うつ病	アミティーザカプセル：嘔吐，下痢，めまい 花粉症 内服なし 小児喘息→現在なし		17時55分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 18時13分 S：接種後8分くらいから息苦しい。O：顔色良好 BP 97/57 P 85 SpO2 99% Dr 診察 経過観察の指示 18時16分 BP 88/58 P 82 SpO2 99% 呼吸苦あり，四肢冷感あり。 18時20分 Dr診察 気分不良なし →帰宅可	
107	8/25(水)	宇土シティ	1回目	20歳代	女性		喘息		18時03分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 18時15分 顔面掻痒感あり，蕁麻疹なし，気分不良，嘔吐なし。 S：かゆい感じがする Dr診察 経過観察の指示 18時20分 かゆみ消失，大丈夫となる。 Dr診察，症状改善にて帰宅可。	
108	8/26(木)	宇土シティ	1回目	20歳代	女性			8/14頃 T37.3 背中の痛みあり，ナロンエースで服用し解熱。背中の痛みあり。全身痛あり，呼吸苦なし。→2日間あり，その後は36℃代	14時20分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 14時29分 体が火照る感じがある。呼吸苦なし。 BP141/86 P 104 SpO2 99% T37.7 Dr診察 観察室へ移動する（独歩） 14時35分 BP133/82 P 97 SpO2 99% T37.5 14時45分 T36.7 他症状なし，Dr診察 症状改善，帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
109	8/26(木)	宇土シティ	1回目	30歳代	女性		肥満		14時58分 ワクチン接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 15時13分 S：右耳の聞こえが悪い、目の前が見えづらい、呼吸苦あり。 普段の血圧は110台 BP 65/30 P 52 SpO2 99% 15時20分 BP 85/61 P 74 SpO2 96% R12回/分 Dr診察 呼吸苦なし、指先チアノーゼあり。車いすにて観察室へ移動。 耳、目の症状軽減あり。下肢挙上 15時23分 BP 106/62 P 66 SpO2 98% Dr診察16：00までの観察の指示 15時23分 チアノーゼ軽減 15時40分 BP 99/68 P 64 SpO2 98-99% S) だいぶ良くなりました。 15時50分 帰宅前に臥位から座位へ ふらつきなし。 BP 107/63 P79 16時02分 BP 109/69 P 73 SpO2 98% 気分不良なし Dr報告 帰宅可	
110	8/26(木)	宇土シティ	1回目	20歳代	女性			接種前から緊張しすぎ、ドキドキしますと訴え有。涙目になっている。数回お話しするも、まったくドキドキ変わらない。Dr指示で観察室で横になってから接種するよう指示。	16時43分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 16時50分 S) 緊張しているけど気分は悪くないです。 BP 112/82 P 91 SpO2 99% 16時59分 BP113/79 P92 SpO2 100% 何もなく観察時間終了してから帰る。	
111	8/26(木)	宇土シティ	1回目	30歳代	男性	バセドウ病	花粉症		18時25分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 18時32分 右手の第4指 しびれと痛み。接種後3分前から感じていた。 BP135/78 P60 SpO2 99% Dr診察 15分観察追加 18時44分 両腕顔の発赤あり（本人の携帯に写真あり）本人の訴えでは、皮疹は接種前からありました。皮疹がよくです。痒みはありません。右第4指のしびれは軽減 セレスタミン1錠 内服の指示 内服する。 19時10分 BP 125/75 P 57 SpO2 99% 右第4指のしびれは症状改善 帰宅可	
112	8/26(木)	宇土シティ	1回目	30歳代	男性		鼻炎、ハウスダスト		15時27分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 15時45分 右手の第5指から手背のしびれ 他に症状なし Dr報告 経過観察 BP110/75 P70 SpO2 100% 頸椎症の可能性あり。気になるなら整形外科を受診するよう指導して帰宅可。	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
113	8/26(木)	宇土シティ	1回目	30歳代	女性				15時50分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 16時02分 吐き気あり。嘔気なし。 BP112/77 P 98 SpO2 99% Dr報告 経過観察時間延長 16時13分 BP112/77 P 98 SpO2 99% 症状継続 16時20分 BP117/76 P 91 SpO2 99% 吐き気持続するもめまいなし。 帰宅可	
114	8/26(木)	宇土シティ	1回目	30歳代	男性	クローン病			17：40 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） L 17：46 BP 169/108 P 89 SpO2 99% KT36.9℃ 接種直後に目前にボーっとした。両手こわばり感（+）吐気（-） 酔っぱらった身体を感じ Dr指示 30分待機 17：51 緊張していた。麻酔あけのような気がする BP 139/100 P 76 SpO2 99% Dr診察 18：02 BP 161/94 P 82 しびれ感 手足の動きOK 18：05 セレスタミン1T 18：12 BP 135/94 SpO2 99% HR 77 18：22 本人OKと言う 症状改善 帰宅可	
115	8/26(木)	宇土シティ	1回目	50歳代	女性				17：40 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） L 18：04 BP 144/94 P 78 SpO2 97% Dr診察 神経症状左右差なし 30分待機の指示 左上腕 接種部からの痛みとシビれあり 時間とともに指先へ広がった 18：18 BP 134/83 P 76 SpO2 98% 症状残存も強くなっていない 表情よく帰宅可	
116	8/27(金)	宇土シティ	1回目	30歳代	女性		花粉症		16時15分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 16時24分 目のチカチカ、両手掌の発汗、冷汗、動悸、頭がボーっとすると訴えあり BP138/78 P72 SpO2 100% Dr診察、指示。臥床にて経過観察 16時29分 独歩にて観察室へ移動する。 16時30分 手指冷感改善傾向あり、上記症状消失したといわれる。 16時44分 BP 98/63 P59 臥位 BP 107/75 P70 座位 手指冷感なし Dr診察 症状軽快にて帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
117	8/27(金)	宇土シティ	1回目	30歳代	男性				16時23分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 16時38分 観察終了後，立ち上がった時にS：息苦しい BP 118/84 P 78 脈緊張あり。 S：圧迫感がありましたが，良くなりました。と症状回復 S：緊張していました。 Dr診察 帰宅可能。帰宅後不調があれば救急要請をと指示あり	
118	8/27(金)	宇土シティ	1回目	30歳代	女性	喘息	アレルギー性鼻炎		16時32分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 16時54分 S：めまいがします。 Dr診察 立ち上がった時にふらつきあり，経過観察 BP 139/88 P66 SpO2 100% 17時02分 Dr指示にて再度立ち上がり，ふらつきなし S：よくなりました。 BP 123/85 体調normal ful 可 体調不良あれば119へとコメントあり，帰宅可能	
119	8/27(金)	宇土シティ	1回目	10歳代	女性				16時33分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 16時47分 呼吸苦あり。 SpO2 100% 16時53分 顔面蒼白，手指冷汗あり S：手が冷たいです。 BP 79/52 P60 車いすにて救護室へ移動する。 16時55分 Dr指示にて酸素吸入 2L 開始。下肢挙上，肩枕もて額up 深呼吸促す。SpO2 100% 点滴指示にて生理食塩水500ml（右正中24G サーフロ）全開開始 BP 83/54 P73 SpO2 100% 17時01分 Drより 過換気症候群，手指やしびれあり，ゆっくり深呼吸の指示 BP 75/50 P78 17時13分 母到着。小児の時過呼吸あり。BP 102/77 P97 T36.3 Drより母へ，迷走神経反射，聴覚上，胸の音は問題なしと説明。 17時14分 Dr指示にて酸素1Lへ減量。点滴終了抜針との指示 17時20分 BP 104/68 P60 SpO2 100% 肩枕除去する。両足，手の指先のしびれあり 酸素流量は適時減量化とDrより 17時35分 P55 SpO2 100% 酸素流量0.5Lへ減量 17時45分 BP 98/67 P52 SpO2 99-100% 17時55分 点滴終了。BP 104/72 P60 SpO2 100% 酸素吸入OFF 17時58分 座位にて気分不良等なし 18時00分 BP 102/73 P74 SpO2 99% 座位 18時05分 BP 100/70 P65 気分不良なし。Dr報告，診察。帰宅可能。 18時20分 母の付き添いにて独歩にて帰宅	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
120	8/27(金)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性				17時21分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622） 17時30分 S：両肩が重くなった。 BP 113/86 P 60 SpO2 99% Dr診察，指示。17時36分まで観察後症状悪化なければ帰宅可能 17時33分 症状変わりなし。帰宅可	
121	8/27(金)	宇土シティ	1回目	30歳代	女性		紫外線，機械性蕁麻疹	接種会場スタッフ	18時25分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622）左上腕 18時33分 左上腕全体のしびれ感あり，手を握りづらい。両手掌発赤あり BP131/97 P77 SpO2 98% Dr診察，18時55分まで観察の指示 18時48分 めまい少しあるとのこと。楽な姿勢をとり治まる。 18時54分 BP 115/82 P76 18時56分 観察室へ独歩にて移動。S：ほわっとする。 両手掌発赤軽快，しびれ感消失，違和感のみ継続。 19時10分 Dr指示にて症状軽快にて帰宅可能	
122	8/27(金)	宇土シティ	1回目	30歳代	女性	メニエル病，偏頭痛	アレルギー性鼻炎・花粉症，タコ		16：32 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF3622）左上腕 16：48 BP 130/99 P 87 SpO2 99% S:めまいがする 眼振なし 吐気なし 呼吸苦なし 16：52 少し良くなった 立位 問題なし 16：56 BP 128/100 P 80 SpO2 99% 17：10 BP 124/94 P 65 S:少し良くなった 17：50 S:だいぶ楽になりました BP 121/79 P 55 めまい（－） 18：05 症状改善 帰宅される	
123	8/29(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	男性				11時30分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 11時33分 接種後に説明書を読んでいたら吐き気あり，気が遠くなった。 気分不良にて椅子から転倒しているのを発見。 車いすにて観察室へ移動。Dr付き添い，車いす移動中に意識消失，痙攣あり 2-30秒で消失 BP 114/59 P45 SpO2 98% 11時40分 Dr指示で緊急連絡先である母に連絡。 11時46分 Dr指示にて水分を経口摂取。吐き気なし。座位で気分不良なし。 11時49分 本人より「今はどうもない。注射の痛みでびくりました」とのこと 転倒時の打撲に関しても痛みなしの申告（スタッフより頭部の指示あり） 11時53分 BP 138/85 P60 Dr診察，1時間経過観察の指示。 11時59分 母親到着，Drより説明。Drの提案により，2回目は臥位にて接種を提案。 12時25分 Drよりコメント。「皮疹，呼吸苦など，アレルギー反応なし。迷走神経反射によるものが疑われる」旨を説明。接種後1時間観察をする。 12時27分 BP 116/68 P44 臥位 12時28分 BP 114/65 P51 座位 BP 104/65 P57 立位 12時30分 歩行時気分不良なし，帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
124	8/29(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	女性		アトピー、風邪の罹患時、 薬でアレルギー反応あり		12時43分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 12時53分 耳が聞こえずらい 気分不良はないが目がボーっとしてみえる BP 76/43 P81 SpO2 98% 車いすにて観察室へ移動 12時59分 BP107/65 P72 SpO2 98% 水分を二口接種後、吐き気はなし。 13時02分 Drより説明。アレルギー反応ではないと思われる旨を説明。両親に経過説明済 13時10分 BP 94/64 P68 皮疹なし 13時30分 BP 93/64 P66 症状軽快にて帰宅可能	
125	8/29(日)	宇土シティ	1回目	40歳代	女性	関節リウマチ	アナフィリジン薬疹		13時17分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 13時45分 刺入部のひりひり、5分しないうちに汗、吐き気、おなかガギュツとした。 倦怠感あり、呼吸苦と頭痛なし。生理2日目 BP95/60 P51 SpO2 100% 13時50分 BP105/63 P60 SpO2 100% 13時52分 Dr指示にて生理食塩水500ml点滴。左前腕24G、全開開始。下肢挙上 13時57分 BP105/58 P49 SpO2 100% 14時05分 BP128/67 P51 SpO2 100% 点滴速度を緩める 14時10分 BP114/73 P54 SpO2 99% 吐き気、頭痛なし。Dr指示で抜針OK 14時15分 起き上がるとややふらつきあり。 14時21分 BP122/73 P60 SpO2 99% 14時23分 抜針、残280。帰宅可能	
126	8/29(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	女性		キウイ、メロン。のどのイガイ ガと息苦しさ		14時36分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 14時57分 BP122/73 P85 SpO2 99-100% 左手掌ち左指先に掻痒感あり、発赤あり。息苦しさ吐き気はなし。 15時06分 BP109/78 SpO2 98-99% 症状は継続。 Dr診察後、呼吸状態に問題なく帰宅可能。蕁麻疹症状が全身に広がる場合は 医療機関受診の指示	
127	8/29(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	女性				15時25分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 15時30分 目がちかちかする、発汗あり。吐き気なし。顔色不良あり。下肢挙上 BP 43/80 P78 SpO2 99% 15時34分 BP98/65 P69 SpO2 97% Dr指示にて10分に1回のバイタル測定。 15時35分 BP102/65 P70 SpO2 99% 冷汗あり。 Dr指示にて。30分程度の観察と皮疹のチェック 15時45分 BP100/64 P69 SpO2 98-99% 冷汗、皮疹なし。 日頃の血圧も100前後とのこと 15時55分 BP99/60 P63 SpO2 99% 冷汗、気分不良、皮疹なし、顔色改善。 Dr診察後帰宅可能	

症例	発生日	会場	接種回数	年代	性別	基礎疾患	アレルギー	既往歴・その他	経過	救急搬送
128	8/29(日)	宇土シティ	1回目	10歳代	男性				16時25分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 16時40分 観察終了後帰宅のため立ち上がった際、気分不良あり。耳が聞こえづらい。 目がぼやける。吐き気あり。嘔吐少々 BP89/48 SpO2 97% 16時47分 BP127/41 P81 SpO2 100% 咳、気分不良あり。車いすにて観察室へ Dr指示にて30分経過観察、呼吸と皮疹のチェック。 16時48分 母親到着、Drより状況説明済。水分を少量摂取、吐き気なし 16時55分 BP129/83 P78 SpO2 100% 17時03分 BP118/68 P69 SpO2 98%臥位 BP110/75 P74 SpO2 98%臥位 BP124/77 P71 SpO2 98% 立位 気分不良なし。Dr診察後帰宅可能	
129	8/31(火)	宇土シティ	2回目	60歳代	女性				15時09分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 15時17分 左上腕に点状発赤あり、気分不良なし、痒みなし。 BP144/103 P71 SpO2 99% Dr診察、経過観察30分の指示。 15時28分 BP130/89 P67 SpO2 99% 発赤軽快、他症状なし。 15時39分 BP125/84 P63 SpO2 98% 発赤軽快、他症状なし。 Dr診察後帰宅可能	
130	8/31(火)	宇土シティ	2回目	60歳代	男性				16時23分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 16時29分 目の前がぼーっとする。立位にて頭がふらつとした。 BP120/93 P83 SpO2 98% 普段の血圧は120/80台 Dr診察、5分後にバイタル測定。 16時36分 BP118/81 P77 SpO2 98% Dr診察、帰宅可能。	
131	8/31(火)	宇土シティ	2回目	20歳代	女性	パニック障害	花粉症		17時32分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 18時10分 15分観察終了後に両手掌発疹が気になる。掻痒感、気分不良なし 両親も同様の心配あり。Dr診察、帰宅可能	
132	8/31(火)	宇土シティ	2回目	50歳代	女性	高血圧症	ハウスダストアレルギー		17時35分 接種（ファイザー製 コミナティ筋注FF2782） 17時40分 両手掌に点状発赤あり、気分不良なし。 BP148/95 P68 SpO2 97% 普段の血圧は120/80台 Dr診察、5分間の観察延長の指示 17時58分 BP159/82 P61 SpO2 98% 両手掌発赤強弱あるも、他症状なし Dr診察、帰宅可能	